

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

外科精義卷下

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣范鳴謙

欽定四庫全書

外科精義卷下

元 齊德之 撰

漏蘆湯

治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚睛五發瘰癧初
覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛
四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便秘濇
小便赤黃並宜服之姓身莫服

漏蘆

白薇

黃芩去黑心

麻黃去節

升麻

芍藥

甘草炙

石膏已上一

兩

大黃二兩

枳實

右除硝外餘咬咀與硝同和勻每服三錢氣實人五錢水一盞半文武火煎七沸去粗空心熱服

化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉閉塞發熱惡寒

沒藥

乳香

已上各五錢另研

草頭烏

醋浸炮製

浮石

已上各一兩燒赤醋滓七次研餘醋另研

已豆

四十九箇去皮生用另研

右五味為細末用浮石烏頭餘醋打麵糊為丸如豌豆大每服五七丸食後冷酒送下忌熱飲取快利三二行或吐出惡為効

內消丸

治瘡腫初生及癰癰結核熱毒鬱滯服之內消矣大効

青皮

陳皮

已上各二兩

牽牛

八兩取頭末二兩

薄荷葉

皂角

已上各八兩不利者取麝皮槌碎二味水一斗煮令極輒搗汁

去粗用

熬成膏

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用煎膏子和丸如菜豆大每服三十九食後荊芥茶清溫水皆可下

五利大黃湯

治人年四十已前氣血盛多若患瘡疽大小便秘者

大黃

根

黃芩

去腐

升麻

已上各二兩

芒硝

梔子

已上各二兩二錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎五七沸去粗空心稍

熱服

內消升麻湯

治證同前

大黃

升麻

當歸

黃芩

去腐

枳實

炒去穢

芍藥

已上各二兩五錢

甘草

炙一兩五錢

錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去粗食前稍熱服

五香連翹湯 如不用五香曰七味連翹湯

治證同前

沈香

藿香葉

木香

丁香 已上各一

兩

麝香

一字五味為粗末另研

連翹

射干

獨活

升麻

甘草

寄生草

已上各一兩

大黃

一兩五錢

右七味咬咀與前五味和勻每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服取利為効未利則再服食前

牡蠣大黃湯

治證同前

牡蠣

木香

大黃

煨已上
各等分

右咬咀每服三錢水一盞半煎至七分春夏露瀉一宿於雞鳴時空心服之冬月於煖處放一宿婦人重身者勿服此藥決利三兩行便勿服已上五方對證

選用

和血通氣丸

治證同前

人參一兩

麥門冬去心二兩

大黃

黃芩去腐

黃連已上各四兩

牽牛一斤炒香取頭末四兩

右六味為細末煉蜜和丸如豌豆大每服二三十丸
食後溫水送下尋常積熱之人隔三二日服此藥微
利潤動永不生瘡腫如已早覺者服之亦得內消矣

地黃煎丸

治臟腑有熱胃腸痰實血氣不和經絡祕滯多生瘡
腫已患惡瘡毒腫大小便結滯

生地黃

新者十兩洗
水浸研如泥

黃連

五兩

黃芩

去腐
三兩

枳殼

炒去
穢

大黃

已上各二
兩五錢

人參

二兩

右除地黃煎外並為細末再和地黃煎和搗入煉蜜
丸如豌豆大每服五七十九食後溫水下素有熱之

人日服百餘丸不發瘡瘍年高氣弱之人亦宜常服

清利胃膈明目

槐角煎丸

治瘡瘍瘰癧疥癬赤腫等瘡

天麻

川芎

甘草

黃藥子

甘菊花

人參

已上各一兩

何首烏

苦參

已上各一

兩五錢

荊芥穗

防風

已上各二兩

槐角

并仁另放

皂角

不時者已上各四兩水一斗煮輒搽汁去粗取仁熬成膏子其皂角取肉研入膏子為用

右除皂角膏外槐仁與諸藥為細末入膏內溲和煉蜜為丸如豌豆大每服五十丸食後竹葉湯下

皂角煎丸

治風毒瘰癧

皂角

不蛀者三十錠炮黑十錠酥炙十錠用水一斗煮汁為度

何首烏

玄參

薄荷葉

已上各四兩

右為細末與煎膏子同煉蜜為丸如豌豆大每服三四十丸食後溫水送下

苦參散

出野人多効方

治遍身瘡疥經年不效

苦參

蔓荊子

何首烏

荊芥穗

歲靈仙

已上各等分

右為細末每服二錢食前酒調下日進三服忌發風物

苦參丸

治證同前

山梔子仁

苦參

防風

玄參

獨活

枳實

甘菊花

黃連

去鬚

黃芩

大黃

各等分

右為細末煉蜜為丸如豌豆大每服五十九茶酒仕

下食後服

肺風丸

今體治世方

治面鼻風瘡及皴皵

細辛

旋覆花

羌活

已上各一兩

晚蠶蛾

翅去

足

苦參

已上各二兩

右為細末，軟飯和丸，如梧桐子大，每服五十九茶酒任下，不拘時。

連翹散

治瘡瘍癰腫一切惡瘡，疼痛煩渴，大便澹泄，虛熱不寧。

連翹

山梔子

甘草

防風

已上各等分

分

右為麤末每服二錢水一盞煎至七分去粗溫服不拘時候

竹葉黃芪湯

出總錄一百三十一

治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者

淡竹葉

二兩

黃芪

當歸

川芎

甘草

黃芩

去心

芍藥

人參

麥門冬

去心

半夏

湯泡

石膏

已上各三兩

生地黃

八兩

兩

右為麤末每服五錢水一盞半竹葉五片生薑五片煎至一盞去粗溫服

枳殼丸 出總錄

治瘡疳熱癰腫瘰癧

枳殼 麤炒去穢

牽牛 炒取頭末

木香

青皮 已上各一

兩

甘草

大黃

右為細末用皂角長一尺許者三枚約三兩炮焦槌碎以好酒煮軟按取汁熬膏稠粘和前藥末為丸如

梧桐子大每服三五十丸食後葱茶下日進二服

五香湯 出總錄

治諸瘡毒氣入腹托裏

丁香

木香

沈香

乳香

已上各一

兩

麝香

三錢 嘔者去麝加

藿香

渴加

人參

已上各一兩

右為細末每服三錢水一盞煎至六分去粗空心稍熱服總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方

大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘
熱渴昏昧口燥咽乾大便硬小便澀者未可與服

托裏黃芪湯

出總錄

治諸瘡潰後膿多內虛

茯苓

去皮

人參

官桂

去白

遠志

去心

麥門冬

去心

五味子

炮

黃芪

當歸

已上各等

分

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服

食前

托裏茯苓湯

防風

桔梗

芍藥

五味子

川芎

甘草

麥門冬去心

桂去皮

熟地黄

已上各一兩

黃芪

茯苓

已上各一

兩五錢

右為末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服

托裏當歸湯

大醫瘡科何氏五方

當歸

黃芪

人參

熟地黃

川芎

芍藥

甘草

炙

柴胡

已上各等

分

右為麤末每服五錢水一盞煎至六分去粗食前溫服

托裏散 出太醫瘡科成子玉方

川烏頭 炮

茯苓

已上各三兩

乾薑

炮

麻黃

去節

甘草

炙已上各一兩五錢

杏仁

炒去皮尖

五味子

桂心已上各一兩

右為麤末每服五六錢水一盞半煎至一盞去粗食

前溫服

托裏玄參散出總錄

主托裏止渴解熱煩渴

玄參

人參

甘草炙

甘菊花

右為細末每服三錢菜豆湯調下亦名內托散

內托散

洪氏方有芍藥總錄無芍藥亦名生肉芍藥炒

治癰疽潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡瘍亦可服
內消宜詳細用之

當歸

芎藭

黃芪

厚朴

去皮

桔梗

防風

甘草

炙

官桂

去皮

人參

白芷

芍藥

已上各
一兩

右為細末每服三錢溫酒調下或木香湯亦可

內補散

聖惠六十一總錄二百一十八無川芎

黃芪

麥門冬

去心

川芎

當歸

茯苓去皮

人參

五味子

已上各一兩

遠志去

心

甘草炙

桂心

已上各五錢

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片棗三枚煎八

分溫服無時

內塞散

總患一百二十三萬全方中去附子

治相瘦不差諸瘡

附子

二箇炮

官桂

去皮

赤小豆

甘草

黃芪

當歸

茯苓

防風

白芷

桔梗

川芎

人參

遠志

去心

厚朴

已上各一兩

右為末每服二錢溫酒調下空心日進二服

香粉散

王托裏止痛解煩渴退虛熱

真萊豆粉

三兩

南乳香

一兩

右為細末每服三錢新水調下

止痛當歸湯

出總錄一百三十

治腦疽發背穿潰疼痛

當歸

黃芪

人參

官桂

芍藥

甘草

炙

生地黃

已上各一兩

右為麤末每服五錢水二盞半煎至一盞去粗溫服
日進三服

黃芪茯苓湯

出總錄一百三十

治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪

白茯苓

官桂

去皮

麥門冬

五味子

川芎

已上各一兩

右為麤末每服五錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服食前日進三服

內補防風散

附子

二箇炮去皮

防風

茯苓

白芷

桔梗

川芎

當歸

人參

甘草

炙

遠志

官桂

去皮

黃芪

已上各一兩

厚朴

二兩生薑汁製

赤小豆

半升酒浸一宿

右為細末每服三錢溫酒調下

伏梁丸 出養生必用方

治環臍腫痛腸胃瘡疽

厚朴

生薑汁製

茯苓

枳殼

麩炒去穰

白朮

京三稜

炮

半夏

湯洗七次

人參

已上各一兩

右為細末麵糊為丸如小豆大每服二十九食前米

飲湯下

溫經丸 出前方

治陷脈痿

厚朴

生薑汁製

官桂

去皮

白朮

甘草

炙

乾薑

炮

木香

已上各一兩

附子

二兩醋浸炮淬一天去皮臍

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食後

飲湯下

木香瀉腫湯

治諸瘡疽始發腫焮增長熱痛

木香

犀角

大黃

梔子仁

升麻

黃芩

黃連

射干

黃蘗

白薇

甘草

炙

朴硝

紫檀

羚羊角

已上各一兩

右咬咀入生地黄汁五合如無只用生乾地黄五兩
剉碎和勻每用藥五兩水一斗煎至七升入麝香五
錢淨帛蘸藥熱瀉腫上日兩三度冷即再換

升麻瀉腫湯

升麻

黃芪

防風

川芎

生地黄

細辛已上各等分

右咬咀用藥二兩水三升煎十沸稍熱淋內消如神

猪蹄湯出聖惠方

升麻

甘草

芍藥

蒴藋已上

各等分

右咬咀每用藥四兩水一斗猪蹄一對煮蹄軟取出
次下藥再煎十沸帛蘸淋溺之

甘草大豆湯出聖惠方

治外陰蝕下疳瘻瘡腫病

甘草

三兩

赤皮葱

三莖

大豆

一合

右用水三升煮豆熟為度用槐條一握同煮取清汁熱淋浴冷即再溫浸三二時為度大効

漏腫湯

芍藥

黃芩

去黑心

丹參

白薇

已上各等

分

右咬咀用藥五錢水一升煎十沸帛蘸頻漏之

洗毒湯

苦參

防風

甘草炙

露蜂房上已

各等分

右咬咀水煮濃汁洗瘡腫

浴毒湯

出拾遺衛生方

治小腸風陰瘡癢痛

木通

藁本

枳殼

管仲

白芷

荊芥

甘松

薄荷

已上各等

分

右吹咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升熱

洗浴瘡

何首烏散

出秘寶生方

治遍身瘡腫癢痛

防風

苦參

何首烏

薄荷已上等

分

右為麤末每用藥半兩水酒各一半共用一斗六升

煎十沸熱洗便於避風處睡一覺其痛甚者三日全愈

八仙散

出衛生方

治遊風腫癢疥癬瘡或因洗頭遊風瘙癢生痛

細辛

荆芥

白芷

川芎

防風

黃芩

甘草

地骨皮

上已

各等分

右為麤末每用藥二兩水二碗煎十沸去粗熱淋瀝

患處

消毒湯

治百雜瘡腫悉能內消

獨活

防風

細辛

藁本

川芎

枸杞子

荊芥

漏蘆

大黃

黃芩去腐

官桂

苦參

歲靈仙

丹參

黃芪

當歸

芍藥

茯苓

黃連

無心草

黃蘗

麻黃

葛根

蒺藜

菊花

杜仲

地骨皮

秦皮

茵草

甘草

甘松

藿香

白芷

露蜂房

升麻

零陵香

已上

各一兩

蒼朮

三兩

石硝

五兩

菖蒲

八兩

右為麤末每用藥中兩水二升葱三莖槐柳枝各一握同煎十餘沸去粗熱淋洗浴此藥用之如神

熨風散

出玉子手中箱集

羌活

防風

白芷

當歸

芍藥

細辛

芫花

吳茱萸

官桂

已上各等分

右為麤末作二劑赤皮葱連鬚細切半斤同礬醋拌勻炒令極熟帛裹於瘡上熨之稍冷即換藥熨之上下痛止而已

應痛丸

治走注疼痛疑是附骨疽者

蒼朮

去皮

當歸

草烏頭

炮

黑牽牛

上已

各一兩

右為細末用醋糊為丸如小豆大每服三十九空心醋湯送下

黃芪丸

治腎臟風虛攻注手足頭面麻痺痛癢或生疥癬腫
焮

黃芪

烏藥

茴香

炒

地龍

去土

川椒去

防風

川楝子炒

赤小豆

白茯苓

去刺

海桐皮

威靈仙

陳皮

已上等

分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒送下

梔子仁湯

出普濟生靈方

治時氣頭面赤腫

鬱金

枳殼

去穰

升麻

梔子仁

牛蒡子

大黃已上各一兩

右為細末每服三錢蜜水調下

葛根牛蒡子湯

治時毒大頭病是也

葛根

管仲

甘草

鹽豉

牛蒡子

各一兩

右為細末每服三錢用水調下此疾近代患者傳染多致天枉治之者少得方法只云太熱必然殊不知

亦有虛實表裏治之者詳其汗下吐不同大抵與傷寒頗類其中亦有可鍼鍼砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎所宜時疾也

通氣散

治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取嚏噴七八遍洩出其毒則差若看病之人用此藥必不傳染

玄胡

一兩五錢

猪牙皂角

川芎

已上各一兩

藜蘆

五錢

躑躅花

二錢五分

右為細末每用紙撚子蘸一米許經於鼻中取嚏為効

白丁香散

治婦人吹妳初覺身熱頭痛寒熱及胃乳腫硬是其候也服之能令下其乳汁通其血脈立能自消矣

白丁香

真者

右為細末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服

金銀花散

治發背惡瘡托裏止痛排膿

金銀

四兩無花用苗
葉嫩莖代之

甘草 一兩

右為麤末分為二服酒水各一盞同煎至一盞去粗

溫服無時

皂蛤散

治婦人因露風邪氣外客於乳內始為吹妳積久不
消以為妳癰此藥導其汗散其風邪汗出其病自然

痊愈矣

皂角

不蛀者
燒存性

真蛤粉

已上各
等分

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候

十香膏

治五發惡瘡結核癰癰疔瘰癧疔

沈香

麝香

已上各
一錢

木香

丁香

乳香

甘松

白芷

安息香

藿香

零陵香

各五錢同
為細末

當歸

川芎

黃芪

木通

芍藥

細辛

升麻

白薇

獨活

川椒

藁本

菖蒲

厚朴

木鱉子

官桂

商陸根

各二兩
劉碎

桃仁

杏仁

栢子仁

松子仁
各五

錢

槐枝

桑枝

柳枝

松枝

各二兩
劉

沒藥

輕粉

雄黃

硃砂

雲母石

生犀角

亂髮灰

白礬灰

各二兩另研如粉

真酥

猪脂

羊腎脂

各二兩

黃丹

一斤

清芝麻油

三斤

右先於木炭火煉油香熟下一十六味剉碎藥并四枝四仁熬至紫黑色出火濾去粗入脂酥煎十餘沸再以新綿濾過油澄清拭鐺令淨再入火上煎油沸下丹用濕柳枝作簞子不住攪熬一日滴在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勻再上火入雲母等粉八味輕煎令沸出火不住攪一食時於磁盒

內密封收每用量瘡口大小緋帛上攤貼之腸胃癰疽可作九如梧桐子大每服七丸空心溫酒送下

犀角膏

當歸

川芎

黃芪

白芷

白薇

杏仁

木鱉子

官桂

乳香

沒藥

已上各一兩

亂髮灰

五錢

黃丹

二斤

清油

五斤

右前八味細剉於油內先浸一宿於木炭火上熬至

白芷杏仁焦瀝去粗澄清再煎油沸下丹以濕柳木
簞子不住攪旋滴藥在水中如珠不散出火候一時
辰下乳香沒藥并髮灰攪勻於磁盆內收依常法攤
用之

乳香膏

治一切惡瘡打撲走注疼痛

乳香

研

珠子瀝青

白蠟

已上各五錢

白膠香

二

兩

杏子油

一斤

右將瀝青於木炭火上先溶開下白膠香黃蠟化開
入油攪勻以綿濾去粗於井花水中持拔白色如銀
再溶入乳香在內拔白色收磁盒內依常法攤用之
白龍膏

治頭面五發惡瘡及燒湯凍破潰爛止痛生肌清血
脈消毒散腫通氣脈如神至可無癰痕

輕粉

五錢
另研

白薇

白芷

白薇

黃芪

商陸根

柳白皮

桑白皮

已上

各一兩

乳香

二兩另研

定粉

另研

黃蠟

已上各八

兩

杏子油

一斤如無用芝麻油

右七味剉油內揉浸三日於木炭火上煎令白芷黃色濾去粗於油中下黃蠟乳香後溶開出火再濾候微冷下輕粉定粉急攪至冷磁盒內收貯每用緋絹上攤用之

消毒膏

當歸

黃芪

川芎

杏仁

白芷

白薇

零陵香

槐白皮

柳枝

嫩者

木鱉子

用仁

甘松

已上各五錢剉

乳香

沒藥

已上各三錢

輕粉

一錢

硃砂

朱紅

已上各五

分

麝香

一分

黃丹

炒紫色

黃蠟

已上各八

兩

芝麻油

一斤

天麻膏

治疥癬赤禿手足癬皮剝起癰瘡疔瘡侵蝕痛膿汁
浸淫滋蔓經久不差者

草烏頭

釣苓根

木鱉子 用仁 天麻

藜蘆

川芎

狼毒

已上各五錢

輕粉

粉霜

已上各二分另研

臘猪脂

二兩

黃蠟

六兩

油 一斤

右前七味細剉如麻豆大於油內煎至黑紫色令冷
濾去粗上火入黃蠟猪脂溶開再用重綿濾過入輕
粉粉霜攪凝磁盒內收貯用以塗摩之大効

善應膏

出六京寶梵院明昌六年間進方

當歸

白芨

官桂

白薇

白芷

杏仁

木鱉子仁

已上各一兩到

乳香

沒藥

已上各五錢研

黃丹

二斤

芝蔴油五

斤

右先將油煎剉藥令白芷焦黃濾去粗再煎油沸下丹用濕柳簞子不住手攪滴在水成珠子住火入乳香沒藥攪勻以磁盆內收貯每用以常法攤用之

靈應膏

出總錄

治五發惡瘡癰疽結核乳癰

白麥飯石

燒醋淬
七次

白薇

已上各
五兩

鹿角

十兩
燒存

性

右為細末每用醎醋中熬如膏厚塗於上中心留一
竅以出其毒以故舊軟布攤之貼未成膿者貼即自
消已成膿者便潰惡肉疾出新肉早生効不必具陳
用之如神

翠玉膏

治軟癰膿水逼流愈後復發

明瀝青

四兩

銅碌

二兩

芝麻油

三錢

棕猪膽

三

箇

右先於炭火上溶開瀝青入油令沸下膽汁攪勻入水中用手搏搗磁盒內收貯用於緋光帛上量瘡大小攤貼之不須再換一上便痊可自落為度

追毒散

太醫成子玉方

治一切惡瘡膿水不快者

五靈脂

川烏頭炮

白乾薑

炮已上各一兩

全蝎五錢

右為細末用少許摻瘡口中深者紙撚蘸藥絛入瘡口內以膏貼之或水浸蒸餅令浸透搗去水和藥令勻攪作錠子每用絛入瘡中亦名追毒錠子

迴瘡錠子

治丁瘡大効

草烏頭

一兩蟾酥七粒

巴豆

七箇去皮

麝香

一字

右為細末麵糊和就攪作錠子如有惡瘡透丁不痛無血者用鍼深刺到痛處有血用此錠子紐之上用膏貼之丁瘡四畔紐之其丁三二日自然拔出此藥最當緊用

射膿丸

治諸瘡癰膿水已成即當鍼開決出陳臭惡瘡則其治也若其惡瘡不出欲鍼石須當開發用此藥以射出其膿也

白礬灰

一錢

砒霜

五分

黃丹

一字

右為末麵糊為丸撚作錠子每用粘瘡頭欲出處以膏貼之自潰

替鍼丸

出保生信効方

治證同前

陳壞米末

一錢

碓砂

五分

雄雀糞

真者

二十枚

右為細末粳米粥丸如粳米樣每用一丸粘在瘡頭

上以膏貼之

治療癰并馬老鼠瘡

銅碌

斑猫

砒霜

已上各五分

右為細末醋糊為丸如鼠糞大每用時一錠子作三丸納於瘡口上以膏貼之如無瘡口乾摻之亦妙

翠霞散

治百雜惡瘡去毒去肌

滑石 一兩

銅碌 五錢

輕粉 二錢

片腦

麝香

已上各三分

粉霜

一字

右為細末每蘸藥紐於瘡口內以膏貼之或滑石二兩名二聖散量其淺深輕重用之

搜膿散

治年深不較惡瘡

白芷

一兩

芎藭

二兩

白芍藥

三兩

輕粉

三錢

右為細末每用乾摻瘡口上瘡口深者紐之

引膿散

治證同前

狼毒

釣苓根

無心草根

白丁香

已上

各五錢

麝香 一字

右為細末如前法用治之

乳香散

治證同前

白乾薑

苦丁香

草烏頭

已上各五錢

釣苓根

狼毒

乳香

已上各一兩

右為細末每用乾摻之或唾調作錠子紐入瘡內

釣苓散

陳官寶方

治證同前

井鹽

一兩

無心草

乾薑

已上各二兩

釣苓根

三

兩

右為細末每用乾摻之或唾調少許塗在膏上就貼之

截疳散

治年深疳癰瘡大效

蜜陀僧

白薇

白芨

黃丹

已上各一

兩

黃連

五錢

輕粉

一錢

腦子

麝香

已上各五分

右前四味為細末後四味另研極細和勻為散每用或摻或紐瘡口中以膏貼之

抵聖散

治耳中膿經年不愈及驢涎馬汗攻焮瘡瘍骨疳疳

瘰癧等瘡

白礬灰

一兩

烏魚骨

三錢

乳香

二錢

乾胭脂

輕粉

已上各一錢

麝香

五分

右為細末或摻或絀以膏貼之如有耳膿者用一字絀耳中

青金錠子

治諸惡瘡膿出不快者及多年疔瘰瘡愈而復發

白丁香

銅青

硃砂

粉霜

輕粉已上各五分麝香

龍腦已上各一字

右為細末麵糊為丸撚作錠子每用絛入瘡口中膿

水出快

白龍散

主生肌止痛及耳中卒然大痛

寒水石

四兩燒半白研

烏賊魚骨

研滑石已上各一

研兩

鵬砂五錢

輕粉一錢

右為細末每用乾摻耳中痛者油調如糊滴絛於耳

中痛立止

桃紅散

主斂瘡生肌肉定血僻風邪

滑石

四兩

寒水石

燒二兩

小豆粉

一兩

乳香

輕粉

已上各一錢

右為細末每用乾摻血不止者和燈草貼瘡口上以帛封之

檳榔散

治久患惡瘡肌肉遲生

木香

黃連

檳榔

已上各等分

右為細末每用乾摻之

金黃散

主消腫散毒生肌止痛

黃連

大黃

黃芪

黃芩

黃蘗

鬱金

已上各一錢

甘草

五錢

龍腦

五分另研

右為細末入龍腦研勻若治濕毒丹腫新水調掃赤

上或蜜水調如稀糊用小紙花子貼之或小油調掃如久不差熱毒瘡亦乾摻或水調塗亦佳

生肌散

主斂瘡大効

寒水石

燒

滑石

已上各二兩

龍骨

烏魚骨

已上

各一兩

蜜陀僧

枯白礬

乾胭脂

定粉

已上各五錢

右為細末用藥乾摻瘡口上

水澄膏

治熱毒腫痛大効

大黃

黃蘗

鬱金

天南星

白芨

朴硝

黃蜀葵花

已上一兩

右為細末每用新水一盞半藥末二錢攪調勻候澄底者去浮水以紙花子攤於腫焮處貼之如急燥津唾潤之此藥治熱毒赤腫神効如皮膚白色者勿用之

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定

寒水石

生用

石膏

生用已上各四兩

黃蘗

甘草

已上各一兩

右為細末每用新水調掃之或油調塗之或紙花子小貼亦妙涼水潤之

金露散

出普濟生靈方

治時氣熱毒

寒水石

生用一兩五錢

黃蘗 一兩

白芨

白薇

雄黃

已上各二錢五分

右為細末無根水調以紙花子貼或掃亦妙

消毒散

治諸惡瘡生肌止痛消毒散腫

滑石 一斤

黃蘗 二兩

黃丹 一兩

乳香 五錢

輕粉 三錢

右為細末每用乾摻或燒湯及下注腫瘡風濕疥癬

等瘡油調塗之

大檳榔散

成子玉方

治乾濕疥癬

硫黃

黑狗脊

已上各五錢

輕粉一錢

紅娘子

大檳榔

已上各一兩

右為細末每用藥末半錢於手掌中臨卧時油調如糊兩手搓摩極熱鼻內聞之及摩擦疥上隔日再用甚者不過三上必驗

天麻散

治白禿甜瘡及風毒疥癬

藜蘆

天麻

狼毒

白芷

茵草

釣苓根

草烏頭

管仲

細辛

已上各五錢

雄黃

二錢

輕粉

一錢

右為細末每用藥半兩紙一重綿裹油三兩浸三日
外蘸紙擦患處如稍乾添油一兩添至三兩換藥其
効如神

決効散

治風癢頭瘡

管仲

三兩

白芷

一兩

右為細末油調塗之

水銀膏

治癰瘡疥癬無名惡瘡但是手足瘡疥浸淫多汁久而蟲生塗之神効

簡茹

剉

黃蠟

已上各一兩

黃連

剉

蛇床

微炒

白礬

枯

水銀

已上各一兩

右用臘猪脂七兩熬開下三件剉藥煮至焦紫色去粗再入黃蠟溶開出火稍凝下水銀礬石攪至勻每用塗摩

平肌散

治諸瘡久不斂者

蜜陀僧

花藥石

二味同煅赤色

白龍骨

已上

各一兩

黃丹

乳香

研

黃連

已上各二

錢五
分

輕粉一錢

右為細末入乳香輕粉黃丹同研令勻每用乾摻之
神黃散

治一切熱腫攻焮疼痛

黃蘗末一斤

黃丹

二兩炒
紫色

雄黃

一兩
另研

右同研勻每用新水調如糊敷掃以小紙花貼稍乾
以蜜水潤之

搏金散

治下疳蝕臭爛腫痛

白礬

與蜜陀僧同為末相和於砂鍋內火上炮汁盡

蜜陀僧已上

各五錢

白堊二錢

黃丹

輕粉已上一

錢

乳香五分

麝香一字

右為細末先須另用槐枝蔥白鹽甘草熬湯淋濁洗一二時淹乾搽上項藥每用藥先須洗浴然後搽藥甚者三四次差

金傷散

治刀鑊斧傷僻風止痛生肌

白芨

三兩

陳石灰

風化

桑白皮

黃丹

已上各二

兩

白附子

天南星

龍骨

已上各一

兩

右為細末每用乾貼之

完肌散

治證同前

蜜陀僧

桑白皮

新者

龍骨

已上各四兩

陳石灰

二

兩

黃丹 五錢

麝香 一錢
另研

右為細末乾摻之

定血散

治證同前

黃丹 一兩

烏魚骨

白礬灰

龍骨 各二

兩

蜜陀僧 半斤
桑白皮 一斤

右為細末每用乾摻定血如神

碧霞錠子 太醫陳宮寶方

治惡瘡透不覺疼痛

銅碌一兩

礱砂二錢

蟾酥一錢

右為細末，粳米飯一處擦勻，搥作錠子，粳米樣，每用鍼刺之不覺痛者，但有血出，紐一錠子在內，以膏貼之，或作散以紙撚蘸紐之，亦可。臨證看如何宜合用。

漏蘆湯

治婦人吹妳初覺

漏蘆

練實

大黃

黃芩

芍藥

甘草

已上各五錢

右為麤末每服三錢水一盞半燈草三十莖同煎至一盞去粗溫服無時

玉粉散

出蘇沈蟬方

治陰瘡浸淫不止

白礬灰

定粉

已上各等分

右研細末先洗浴淨淹乾敷摻之

香礬散

治小兒斷臍之後不乾及膿出耳中

枯礬

五錢

龍骨

黃丹

已上各一錢

麝香

少許研

右為細末每用乾摻之

紫金散

治療瘡久不差者

枯礬

五錢

砒霜

一錢

石膽

五分

右為細末入黃丹二錢每用緝入瘡口內以膏貼之

如未破者灸一兩炷用津唾旋調一豆許安瘡上以膏貼之去根自平復

通耳丹

盧仝寶傳

治耳聾

桑螵蛸

安息香

阿魏

已上各一錢五分

硃砂

五分

草薢子仁

大蒜

巴豆仁

已上

各七箇

右為細末入二仁與蒜同研爛為丸如棗樣每用一

九綿裹內耳中如覺微痛即取出親驗方

菖蒲錠子 一名菖蒲散

治耳中卒痛

菖蒲

附子

炮去皮臍已
上各二兩

右為細末每用油調滴耳內立効

寸金錠子 太醫成子寶方

治療痔疾

藤黃

雄黃

雌黃

硫黃

輕粉

粉霜

麝香

砒霜

黃丹

已上各一錢

牡蠣粉

紅藤根

乾漆

已上各五

分

右為細末研勻燒陳米飯和搗為丸如棗核大每用
一丸內肛門中深二寸許放令定用新磚毬子二個
炭火燒赤蘸醋中蘸過綿裹一箇於肛門上熨之冷
即換上下次之來日大便下臭敗惡物除根也

薰痔散

歲靈仙 三兩

右用水一斗半煎至七八沸去火就盆上坐令氣薰之候通手淋溺冷即再煖

通靈丸

治耳聾

松脂 五錢

巴豆 二十四箇
去皮研

右先將松脂溶開入巴豆末熬成膏丸如白豆大綿裹一九塞耳中覺痛取出赤水為効

三神丸

治僧道痔疾因讀養生必効方見乾義傳僧覺海少年患痔疾其行業比冰霜緣此飽食久坐知痔疾者不必酒色過度矣故素問云因而飽食筋脈橫解腸澀為痔治之故不同也

枳殼炒去穢

皂角燒存性

五倍子已上各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三二十九溫水食前服養生必効方中三味皆單用一味為方今

增為一方其効如神

玉芝飲子

治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘草

炙三兩

藿香葉

石膏

水飛

山梔子仁

已上各一兩

右為細末每服一錢新水調下

平和飲子

出顯顯經中

治小兒瘡疹

人參

白朮

茯苓

甘草

升麻

已上各等分

右為細末每服一二錢水煎去粗溫細細飲之量歲大小虛實以意詳之此藥治諸瘡疼煩渴不寧者皆可服之惟小兒瘡疹尤佳

玄參丸 出僧居泰傳

治口瘡連年不愈者

天門冬

去心

麥門冬

去心

玄參

已上各等分

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸噙化

犀角散

治口舌生瘡咽喉腫痛毒時氣

升麻

桔梗

甘草

炙已上各一兩

牛蒡子

炒四

兩

右為細末每服三錢水一盞入竹葉五七片煎至七分去粗細細熱飲溫即嚥之其粗熱掃項腫上

防風散

治破傷瘡瘍風邪或身體疼痛風邪攻注掣急及皮膚瘙癢麻木不仁頭昏悶牙關緊欲成破傷風者

防風

一兩

藁本

羌活

地骨皮

荊芥穗

已上各五錢

右為細末每服三錢溫酒調下

烏金散

治疳瘻惡瘡

麝香

蟾酥

已上各一字

粉霜

硃砂

輕粉

已上各一錢

銅碌

砒霜

白乾薑

草頭烏

天南星

舶上硫黃

已上各五錢

右為細末紙撚絛之或湯浸蒸餅和為錠子絛瘡口

內上以膏貼之

劉守真瘡論

素問云痛癢瘡瘍癰腫疽疹溜氣結核拂鬱甚者皆熱五臟不和九竅不通六腑不和留結為癰近於火氣微熱則癢熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也人之

瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡腫然
肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風濕所
乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者由寒熱毒氣客於經
絡使血澀而不通壅結成腫風邪不作即無頭無根寒
血相搏作者即有頭有根壅盛則為膿赤根腫則風氣
流潰也瘡以痛癢痛則為實癢則為虛非虛為寒也正
謂熱之微甚也癢則美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮
榮美也灸之以火漬之以湯而其癢轉甚者微熱之所

使也癢去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚癢而以冷水沃之其癢不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散拂熱內作故也瘡瘍皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉菓菜熱極則腐爛而潰為污水也潰而腐爛者水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癰疹也瘤氣赤瘤丹燥熱勝氣火之色也

沒藥膏

治一切癰疽發背瘡癰傷折蹊跌壞膿生肌止痛又貼灸瘡極妙

麒麟竭

明乳香

沒藥

已上各一分研

當歸 去蘆

木鱉子仁

研

杏仁

已上各五錢

油頭髮

二兩

黃丹

六兩

右先用油一斤石器內或砂鍋內露天底煉油令熟
先下木鱉子當歸杏仁頭髮慢火熬黃焦油耗五分
離火用綿濾粗不用再入鍋下黃丹以新柳篦子十
條旋換攪不住手候黑色滴在水中成珠子硬輒得

所取下火入三味研藥再攪勻磁盒內盛放地上以盆合一宿出火毒用時或帛上或紙上一日一換必効散

治久患瘰癧不効服此藥取効如神

南鵬砂

二錢五分

輕粉

一錢

麝香

五分

斑猫

四十箇去

翅頭

已豆

五箇去皮心膜

白檳榔

一箇

右同勻極細取雞子清二箇去黃調藥勻却傾在雞子殼內濕紙數重糊定無令透氣坐飯甑內與飯一

處蒸飯熟取藥曝乾研極細末用時相度虛實虛人
每服半錢實人每服一錢並用炒生薑酒下五更初
服藥至平明取下惡物如覺小腹內疼痛使用葶麻
子燒灰入沒藥等分同研細用茶調下一錢便入大
腸其取下惡物如爛肉老鼠及新成卵內雀兒是効
婦人有胎不可服

烏金散

治癰癤腫硬無頭不變色者

米粉

四兩

蔥白

一兩
細切

右同炒黑色杵為細末每用看多少醋調攤紙上貼病處一伏時換一次消為度

抵聖丸

治男子婦人頭面手足虛腫

苦苧蘆

不拘多少於火上隔紙炒過

右杵為細末棗肉為丸如小豆大每服十九煎麻子湯下食前日進三服五七日小便多腫消為効如喘

嗽煎桑白皮湯下忌生冷醋滑物及鹽須另丸一等
小丸兒與小兒服看大小加減與服煎棗肉湯下
應効散

治氣瘻疔瘡多年不愈者

地骨皮

不以多少冬月自
取只要皮陰乾

右杵為細末每用紙撚蘸經瘡口內頻用自然生肉
更用米飲調二錢無時日進三服又名托裏散

白金散

治風攻注毒遍身及手足生熱瘡疼痛有黃水出者
桂府滑石

右為細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許二
碗水煎上項三味至一碗去粗微熱淋洗瘡水冷拭
乾上搽滑石末令通便睡至明決愈

如聖散

治渾身瘙癢抓之成瘡及癰疹之類

蠶沙 一升

右用水二斗煎至一斗濾去粗夜卧避風處淋洗水
冷即拭乾便睡

天蛾散

治刀斧傷止血定痛生肌

晚蠶蛾

不以
多少

右為細末每用藥貼於瘡口上用綿裹不須再動一
上便可

必効散

治蜘蛛咬著疼痛

鹽豉炒乾

右為細末每用油調塗之必効

蛤粉散

治湯火燒燙瘡

蛤蠣燒赤
放冷

右研如粉每用油調塗之日三次

治小兒丹瘤

木鱉子

新者
去殼

右研如泥淡醋調塗之一日三五次便効

治小兒疳口瘡

天南星

一箇
去皮

右為末好醋調堆在紙上男左女右貼在脚心底以帛繫定三日外取了以溫水洗盡脚下藥

治破傷風

并洗頭風藥

麻黃

一錢
去節

蝎梢

二錢
五分

蜜薑

草頭烏

黑附子

蛇去皮

白附子

天麻

烏梢蛇

好酒

浸一二夜去骨
火上炙黃色

川芎

已上各
五錢

右為細末每服一錢熱下日進三五服重者三五日
必効此證只宜早治但邪氣入臟則難治治有四死
證不可治一頭面青黑色二額上有汗珠不流三眼
小目瞪四身上汗出如油

烏龍丸

治遍身風瘡瘙癢疥癬等疾服之消風散熱利膈化

痰唾治肺氣不和此藥推陳致新去腸垢治證甚多

要能用度

皂角

肥者不以多少炙刮去皮弦搗碎甜水樣取濃汁去粗銀石器內熬成膏用

黑牽牛

不以多少微炒令香熟碾取頭末

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五十丸氣虛者一二十丸食後溫水送下無病氣人一兩箇月頓一服取利三五行不傷正氣身體輕健肌膚光澤永無痰疥癬之疾

紫參丸

治熱毒療癰腫毒未成者內消已潰者行膿止痛散腫毒

麝香

另研

膩粉

已上各三錢

紫參

苦參

已上各一

兩

丹參

一兩五錢

連翹

一兩

滑石

二兩五錢

右為末別用玄參一斤搗碎以酒三椀浸三日揉取汁去粗用皂角子三百箇煨熟為末用玄參酒熬皂角子末成膏和前藥丸如梧桐子大每服一九以黃

芪湯一日加一九至患人歲數即佳如四十則二十
每日減一九其瘡自乾已結者內消也服此藥大有
神効

萬靈丸

治背腦疽并一切惡瘡初覺一二日

硃砂

血竭

蓮藥

已上各等分

麝香

少許

右為細末酒糊為丸如黃米大每服七丸溫酒送下
瘡在上食後在下食前不過二服即効

治眼

治昏澀退翳膜

川椒

四兩去子
合者不用

甘菊花

二兩
五錢熟乾地黃

二兩酒浸
九蒸一碗

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後
細嚼新析米十餘粒送下

治吹妳方

田仲寬方

治吹妳及一切惡瘡初覺一二日立効

生薑

一兩
去皮

大黃

甘草

已上各
五錢

芩蘂

一箇
去皮

右共搗作一塊以水半碗同煎至七分濾去粗入沒藥乳香末共二錢半通作一服

治痔瘡

雄黃

五分
細研

五靈脂

去石燒
過斷煙

五倍子

過炮

已上各
一錢

沒藥

二錢五分
明淨者

白礬

半飛
半生

右為細末研令極細用紙花子貼瘡口上

洗痔

防風

當歸

川芎

已上各等分

右三味剉細煎水去粗令熱溫淋洗瘡用軟帛印乾
傳前藥

寸金丹

二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丸
六名來甦丸七名知命丸八名得道丸非人勿示此
方若有人患瘡身未爛者與三丸服之嚥下便活如
口噤但幹開牙關研下三丸灌下喉中立生此方治

發背腦疽癰腫遍身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沈重體壯熱

麝香

一分

南乳香

烏金石

輕粉

雄黃

狗寶

沒藥

已上各一錢

蟾酥 二錢

粉霜

黃蠟

已上各三錢

礪砂

五錢

鯉魚膽 乾用

狗膽

已上各一箇乾用

金頭蜈蚣

七條全者酥炙黃色

頭首兒孩兒乳 一合

右件為末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸如菜

豆大小兒丸如芥子大每服一九病重者加三九白
丁香七箇研爛新汲水調送下用衣服蓋之睡勿令
透風汗出為度大段疼痛如無頭瘡腫不過三服立
効服藥後喫白粥芡蘆就服大妙

牙疳藥

此藥是京兆惠民局見行經驗方

治大人小兒

揀信

青黛

輕粉

已上各一錢

麝香

五分

右同為細末用小油調薄攤紙上用木槌鎚實收起

每用臨卧以漿水洗淨印乾可瘡口大小以藥紙封之至曉去藥紙漱淨勿令嚥下大者不過三上必効
迴瘡蟾酥錠子 陝西醫局提舉馬雲卿親傳經驗方

治丁瘡毒氣攻心欲死以鍼刺其瘡向心行處但覺痛有血處下錠子若累刺至心側近皆不痛無血者急鍼百會穴痛有血者下錠子若無血以親人熱血代之猶活三四况瘡初發無有不効大抵丁瘡生於四肢及胷背頭項骨節間唯胷背頭項最急初生痛

瘡不常中陷如丁蓋撼之有根壯熱惡心是也

天南星

款冬花

巴豆仁

黃丹

白信

已上各一錢

獨活

五分

斑猫

去頭足十箇

右為極細末用新蟾酥和藥如黍米大撚作錠子每遇丁瘡先以鍼刺其瘡必不知痛有血出者下錠子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處迎奪刺之至有血知痛即止其元瘡亦覺疼痛以膏藥傅之膿出自差

用錠子法度以銀作細筒子一箇約長三寸許隨鍼下至瘡痛處復以細銀絲子內藥於筒內推至痛處

乳香托裏散

同前所傳

治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣實者先疏利後服之大効

御米穀

去腸滯萆蜜炒三兩

當歸

芍藥

川芎

已上各五錢

乳香

沒藥

已上各一錢

右為麝末每服五錢水一盞半煎至七分去粗溫服

病在上者食後在下者食前若未止即再服

四聖旋丁散

治丁瘡生於四肢其勢微者先以好醋調藥塗上以紙封之次服內托裏之藥其丁自旋出根

巴豆仁

五兩

白殭蠶

輕粉

硃砂

已上各二

錢五分

右為細末醋調用之

天丁散

同前秘傳經訣

治一切丁瘡及諸惡瘡初生以藥塗之急服托裏內消

山丹花藥

香白芷

已上各五錢

牛蒡根

採春

去皮

天丁

乃皂角刺

蒼耳芽

大力子

已上

各五錢

雄黃

一兩

右五月五日受氣修合為細末每用好醋塗紙封之
丁瘡上有黑甲者必須胡桃油浸次塗之自可

萬應膏

同前所傳

治一切瘡瘍初生腫焮甚者無問大小以膏可腫痕貼之煎葱白水熱淋兩炊時良久再淋腫消為度如瘡老不能差者亦收斂聚膿決然早差

黃蘗

芍藥

白芷

黃芪

木鱉仁

杏仁

當歸

白芨

生地黃

官桂

玄參

去皮剉碎

沒藥

乳香

已上各五錢研

白薇

黃蠟

已上各一兩

黃芩

大黃

已上各二兩

黃丹

一斤

芝麻油

二斤八兩

右件十四味入油內浸一宿絕早入砂鍋慢火熬用
生柳條攪至申時以焦褐色出火去麤粗又以重綿
濾過入丹再熬旋滴水中成珠不散者出火絕煙入
乳香沒藥黃蠟攪勻用磁器收貯於土內埋七日取
出攤用

治小兒面湮瘡

俗云鍊鍛瘡者是母受胎之日食酸辣及邪味過度
多生此瘡

百藥煎 五錢 生白礬 一錢

右為細末小油調旋搽之神効

治赤白口瘡

大人饑渴不時小兒失驚即生口瘡

生白礬 一錢

右噙漱之從瀝頑涎立効

治乾濕疥癬

此是肺受邪毒運於四肢久而不散以生內癰

硫黃一兩

生白礬八錢

右為細末油調火炙抓破塗之立効

治湯火燒燙

無問新舊

青槐枝

一兩
剉碎

萊豆粉

一兩炒
黃色

輕粉一錢

右同為細末油調塗之止痛滅毒

治破傷風

手足顫掉不已者

硃砂

另研

南星

薑製

獨活

去皮已上各二錢

人手足指甲

燒絕煙六錢

右為細末分作三服酒調服之立効

治破傷

無問新舊

石灰

右用一味驗瘡口大小儘乾塗之不須封裏神効

治風狗咬破傷風

此病非為小可乃九死一生之病可急用

好斑猫

七箇去翅足

右為細末酒調服之於小便盆內見衣沫似狗形者為効如無再服七次雖無狗形亦不再發也此方累試經驗今附於此

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

夫藥者治病之物蓋流變在乎病主治在乎藥製用在乎人三者不可闕一也凡用一味炮炙修製及單方主

療該引方書出處不必隨方標寫

硃砂

須研細水飛濾乾若入膏中者待熬膏成稍凝冷即下急攪勿令沈聚大凡石類一一如此

雲母

即須用鍊成熟粉曾經婦人手拈者不効聖惠方治湯火瘡羊髓和膏塗之神良千金方如治金瘡及諸惡瘡依上塗傳大効

礬石 即白礬

凡用須木炭火上枯汁盡主陰蝕惡瘡去鼻中瘰肉
生含嚙津治急喉閉肘後方治耳中卒腫痛或有膿
水者以筒吹一字於耳中以綿塞之立効又治諸毒
蟲惡獸咬傷傳之則差千金方以醋煮湯漬蝎螫立
差王氏博濟治驢馬汗毒傷人瘡腫痛和黃丹傳之
靈苑方治傷折瘡腫以沸湯投枯礬漬浴之御醫院
方治陰汗以枯礬投沸湯中浴之

水銀

主疥癩痂傷白禿入膏令膏冷凝下之攪令分散如星勿令沈聚

水銀粉

即輕粉

主瘰癧殺疥癬蟲酒魘風以羊髓和如膏塗及貼臚瘡一上可

石灰

主疥癬骨疽金瘡風化者良外臺秘要方治風疹以

漿水調熱掃之隨手差孫真人治疥淋石灰水溫洗之千年者尤佳

白麥飯石

即麤理黃石

曾磨刀者佳凡用須醃醋淬之令屑落醋中者良亦單用治發背神良本草曰大凡石類多主癰疽

花藥石

主金瘡止血合硫黃木炭火炒良或只刮花藥石末効

黃芪

主癰疽久敗瘡排膿止痛魚五痔鼠瘻止渴聖惠千金外臺秘要方治發背腦疽托裏止渴用黃芪六兩甘草一兩剉細水煎溫服無時大効

紫耳

即蒼耳

千金翼方丁腫用根莖葉炒灰存性為末醋泔淀和如泥塗之一日二易之三日腫消根丁自拔出亦治諸腫掃之尋差

麻黃

凡用根節煮三沸掠去沫曬乾剉

黃芩

凡用去腐蘆揀細實者佳梅師方治諸丹作末水調
掃之亦治湯火瘡

烏頭附子

凡用須炮裂去皮臍

半夏

凡用湯泡七次去滑

羊蹄根

主乾癬疥頭禿取根嚙塗之効簡要濟衆方治癬瘡
久不差取新者絞汁和膩粉如膏塗之千金聖惠外
臺等方皆治癬和醋或白礬或硫黃塗之皆愈

狼毒

主癰疽惡瘡鼠癭聖惠方治癬瘡積年搔之黃汁出
癢痛以末傅之或猪膏和塗差

芭蕉根

主瘡腫搗根汁塗之良百一方治發背根汁塗之

土青木香

即馬兜苓根

主頭風搔癢禿瘡

連翹

主寒熱鼠瘻癰疽惡瘡癭瘤同甘草服食

蒲公英

主乳癰煮汁飲之自消梅師方傳之亦消

滑石

本草不言療瘡腫本體較治諸瘡久不愈消熱毒腫
及金瘡血不止湯火炒瘡用之尤良

白石英

主肺癰吐膿咳嗽胃膈上風熱痰肺癰消渴陰痿補
五臟

赤石脂

治瘡疽痔瘻瀉痢加芩朮等分粥飲調服一錢重神

効寒者加乾薑服

白石脂

治癰疽排膿生肌新生兒臍濕

雄黃

主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌疥癬

硫黃

主女人陰蝕疽痔惡瘡疥癬殺蟲

雌黃

主惡瘡頭禿下部蜜瘡殺蟲

磁石

消癰腫主鼠瘻頸核喉痛

蜜陀僧

主金瘡止血口瘡疳瘻面上癰黥

伏龍肝

慘主惡瘡水調掃丹腫酒調封發背令肉消

礬石

主寒熱鼠瘻惡瘡蝕死肌

薑石

搗末雞子清調敷丁腫丹瘤乳癰

麤理黃石

或作碓碾者即磨刀礪石

齊馬嗣明治楊遵彥發背取此石猛火煨赤投釅醋
中因有屑落取為末醋熬如糊厚塗立愈大凡石頭
多主癰疽

爐甘石

主愈瘡止血治目赤瘡

燈心

主破傷血出每用貼破上封之立差

槐根皮

主痔及白皮煎湯薰浴良入荊芥尤妙

地骨皮

主疽瘡經年以麤皮煎湯洗之細沫白穰別碾摻之

即差

黃蘗

主瘡腫神良每用去麤皮塗蜜炙剉諸方用作湯清
陰瘡良搗末蜜水調敷腫

枳殼

凡用須麤炒去穰剉枳實亦同

厚朴

凡用須去麤皮生薑塗製炙後焦剉

皂角

凡用須不艸者去黑皮弦子酥炙黃色剉

木鱉子

凡用去殼主惡瘡毒腫孫用和方治痔用仁三五枚
研如泥以沸湯浸用汁先薰但通手即浴洗日三度
楸樹白皮

單用熬膏貼癰疽惡瘡疔瘻痔疾用其白馬牙燒灰
治發背初生用摻瘡頭上以膏封之

兔頭

連皮骨臘月細剉瓶中封之百日塗發腦疽發背惡

瘡

出百一方

兔腹下白毛

治湯火瘡已破者先用膠水掃之後用兔白毛貼之
毛落平復勝金方治痔用玩月砂即兔糞也和乳香
末酒調三錢溫服日三服即差

蜜

凡煉須煎令沸掠去沫外臺治陰頭生瘡以蜜煎甘

草末塗之神効肘後方單用塗湯火瘡

牡蠣

凡用木炭灰炒通赤濕地上攷經宿方用經驗方治
療癰用牡蠣四兩玄參三兩為末糊丸如梧桐子大
酒服三五丸食後服藥盡患亦除根集驗方治一
切癰腫水調牡蠣粉掃之乾即再掃即消名拔毒散
初虞世治療癰用和甘草末茶調三錢服之神効大
驗

蛇退皮

諸方用治丁雜惡瘡十年不差者全用炒存性猪膏和塗之具驗神効

蜘蛛

聖惠治療癰不問新舊或成癰者曬乾為末酥和如糊貼之日三度大効千金治發背瘡亦治鼠癰神良譚氏治贅瘤疣目以網絲作線際根繫之一宿自落

蜈蚣

聖惠治一切惡瘡端午日收乾為末者油調敷之神
効子母秘錄治忽得惡瘡未辨識者取新者絞汁傳
其上大効古今諸方治丁瘡欲死者取蜣螂心腹下
度取之稍白者是以鍼刺丁瘡當心及四畔以心塗
貼之百苦立已經宿其丁自拔出大忌食羊肉多不
効

陳橘皮

凡用溫水浸去白青橘皮亦然

枇杷葉

主嘔逆下氣凡用去毛刺甘草湯洗三葉重一兩者

桃杏仁

凡用須湯浸去皮尖雙仁炒剉或研

無心草

凡用去蘆苗煎洗甲瘰疽神効

防風

凡用去叉蘆

藜蘆

凡用去苗

犀角

凡用生不曾見火者即鑄錯為末

茯苓


凡用去麤皮白者佳

芍藥

亦用白者佳

牽牛子

凡用黑成熟者微炒假如一斤取頭末四兩



外科精義卷下